

# ИННОЗИМ

(Препарат, улучшающий пищеварение)

Надежная помощь при расстройствах пищеварения

Расстройство пищеварения, неприятные ощущения в подложечной области, метеоризм, вздутие живота или чувство тяжести после приема пищи являются частой причиной раздражения и ощущения дискомфорта у многих людей. ИННОЗИМ является испытанной комбинацией пищеварительных ферментов, которая способствует улучшению переваривания и усвоения белков, жиров и углеводов из тонкого кишечника и устраняет нарушения деятельности ЖКТ.

## СОСТАВ:

Каждая покрытая энтеросолюбильной оболочкой таблетка содержит:

Панкреатин Б.Ф. : 192 мг

С минимальной ферментативной активностью:

Липазы : 6000 ЕД FIP

Амилазы : 4500 ЕД FIP

Протеазы : 300 ЕД FIP

Гемицеллюлаза : 50 мг

Экстракт желчи : 25 мг

## ФАРМАКОДИНАМИКА:

ИННОЗИМ является комбинацией трех пищеварительных ферментов, панкреатина, гемицеллюлазы и экстракта желчи, способствующих перевариванию белков, жиров и углеводов. Таблетки ИННОЗИМ имеют специальное энтеросолюбильное покрытие, которое распадается в двенадцатиперстной кишке, где происходит высвобождение активных ферментов. Панкреатин содержит три фермента: протеазу, амилазу и липазу. Протеаза способствует распаду белковой фракции на пептиды, амилаза превращает крахмал в мальтозу, а липаза расщепляет жиры на жирные кислоты и глицерин.

2

Гемицеллюлаза способствует расщеплению растительной клетчатки и её перевариванию. Экстракт желчи способствует эмульгированию жиров и жирорастворимых витаминов, повышая, таким образом, активность липазы.

## ПОКАЗАНИЯ:

ИННОЗИМ применяется для лечения и профилактики нарушений пищеварения, связанных со снижением функции поджелудочной железы, желудка, тонкого кишечника, печени и желчного пузыря. ИННОЗИМ назначают при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы и для улучшения переваривания в случае перекармливания, нерегулярного питания, при длительной иммобилизации и реабилитации после тяжелых заболеваний. ИННОЗИМ уменьшает симптомы метеоризма и вздутия, связанные с нарушением переваривания пищи. ИННОЗИМ также применяется при подготовке к рентгенологическому исследованию органов брюшной полости. Кроме того, ИННОЗИМ устраняет чувство тяжести в желудке у беременных.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к препаратам, содержащим ферменты поджелудочной железы животного происхождения или бычьей желчи, тяжелые заболевания печени с высоким уровнем билирубина в крови, эмболия (закупорка) желчных протоков, эмпиема желчного пузыря, кишечная непроходимость. Ферменты в больших дозах могут вызывать повышение уровня мочевой кислоты в крови и спровоцировать приступ подагры у предрасположенных к ней пациентов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не следует принимать препарат при наличии аллергии на белки, ферменты или подобные лекарственные средства.
- Не рекомендуется принимать препарат без назначения

3

- врача, проконсультируйтесь с врачом, если симптомы не исчезают, если появляются новые жалобы или вы принимаете данное средство в течение длительного времени. При появлении побочных эффектов прекратите прием препарата и сообщите лечащему врачу.
- ИННОЗИМ не назначают при остром панкреатите.
- Таблетки не следует жевать или размалывать.

## БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

При беременности и в период лактации препарат назначается только в случае явной необходимости.

## ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

При совместном приеме ИННОЗИМ увеличивает всасывание парааминосалициловой кислоты, антибиотиков и сульфонамидов.

## ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:

Могут отмечаться аллергические реакции, такие как покраснение, чихание и слезотечение. Чрезмерное употребление заменителей панкреатических ферментов может вызвать появление тошноты, рвоты, диареи, спазмов в области живота и боли. В единичных случаях сообщалось о появлении симптомов перианального раздражения. Прием больших доз препарата, по сообщениям, может вызвать повышение содержания мочевой кислоты в крови и моче.

## ДОЗИРОВКА И ПРИЕМ:

2-3 таблетки проглатывают целиком с небольшим количеством жидкости до еды или во время еды, или по назначению врача.

Перед рентгенологическим исследованием: 2 таблетки 2-3 раза в день в течение 2-3 дней.

4

## ФОРМА ВЫПУСКА:

Стрип по 1x10 таблеток.

Упаковка по 2 x 10 таблеток и 10 x 10 таблеток.

## СРОК ГОДНОСТИ:

3 года от даты производства.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом прохладном месте при комнатной температуре.

Защищать от прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Отпускается без рецепта врача

Не забывайте хранить это и другие лекарственные средства в недоступном для детей месте, никогда не предлагайте свое лекарство другим людям, используйте данный препарат только по показаниям. Информация в данном листке не охватывает полностью все возможные показания, способы применения, меры предосторожности, взаимодействие лекарств и побочные эффекты. Если у Вас возникли вопросы о принимаемом препарате, обратитесь к Вашему врачу, медицинской сестре или фармацевту